JAZZY (0-40 mm)

FRANCELINE x CUPIDO



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Exzellente Geschmack, Textur und Kochqualität.
Sehr schöne Schalequalität.
Sorte mit sehr hohem tuberization.
Sorte geeignet für Anbau von Babykartoffeln.
Geringe Anfälligkeit für Schorf.



Eigenschaften

Knollenform	L	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	9,8 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	7,6	
Schalenfarbe	Y	
Fleischfarbe	6,9	
Speisequalität	8 A	A B C D

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	67	68	82
DM (%)	17,6	18,9	19,4
UWG	317	343	354
Knollen Ø (mm)	37	38	39

Ro1	2
Ro2/3	1
Ro5	1
Pa2	2
Pa3	1
TRV	7
Moptop-Virus	9

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	4
wz 6 (O1)	4
wz 18 (T1)	6

3 = Sehr anfällig, 10 = Immun

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	7
Durchwuchs	7

Resistenz / Toleranz

Krautfäule	3
Knolle Krautfäule	3
Alternaria Knollenfäule	5
Y-Virus	6
Yntn-virus	7
Blattrollenvirus	
Schwarzpunktkrankheit	9
Silberschorf	9
Metribuzin Vorauflauf	9
Metribuzin nach dem Auflaufen	7

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	2,2
Druckpunkte	ziemlich anfällig
Fusarium (9 = Resistent, 1 = sehr anfällig)	4
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	4,3
Verarbeitungsfarbe im Februar*	3,5
verarbeitungsfarbe im Mai*	3,3

**Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel*
Backqualität Pommes/Chips: 8= sehr Gut, 3= Schlecht

Marktgängiger Ertrag

Schwarzfleckigkeit index (0-50)	5
HH (%)	0
IRS (%)	0
Waschfähigkeit	8
Schorf	7
Puderschorf	6
Äußere Beschädigungen	7

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

08/12/2025

JAZZY (0-40 mm)

Pflanzen

Pflanzgut vor Pflanzen ruhig halten und pflanzen Sie gleich aus Lager.
In normaler Tiefe pflanzen.
Der Anbau im Bettsystem ist ein Plus, um die Babyproduktion zu optimieren.
Mehr Info: nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Vertriebsmitarbeiter auf.
Gegen Rhizoctonia / Silberschorf behandeln.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
25/30	15 cm	13 cm	88900
30/40	20 cm	17 cm	66700
40/50	26 cm	22 cm	51300
30/50	23 cm	19 cm	58000
50/55	32 cm	27 cm	41700

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.
Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff	Durchschnittlicher Bedarf für frühe Sorte	150	kg/ha	*Empfehlung basiert auf die*
Phosphat	Höher Bedarf für frühe Sorte	160	kg/ha	
Kali	Geringer Bedarf für frühe Sorte	250	kg/ha	



Stickstoff	100%
Phosphat	100%
Kali	100%

Um den Knollenansatz zu erhöhen, wird empfohlen, Phosphat im Dämmen aufzutragen.

Ernteschutz

Anfällig für die Verwendung von 150 g / ha Metribuzin nach dem Auflaufen.
Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.
Schnelles Knollenwachstum am Ende des Zyklus, rechtzeitig abtöten.

Ernte und Lagerung

Wann Schalenfest gleich roden anfangen, ca. 18 Tage bei dieser Sorte.
Kurze Keimruhe; Nach der Ernte und Wundheilung schnell kühlen und
Temperatur stabil halten und mit Keimhemmung anfangen.
Sobald die Kartoffeln trocken sind Keimungsinhibitoren anwenden.

Lagerung:
2 °C
6 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sort

Pflanzgut vor Pflanzen ruhig halten und pflanzen Sie gleich aus Lager.
Der Anbau im Bettsystem ist ein Plus, um die Babyproduktion zu optimieren.
Um den Knollenansatz zu erhöhen, wird empfohlen, Phosphat im Dämmen aufzutragen.
Wann Schalenfest gleich roden anfangen, ca. 18 Tage bei dieser Sorte.

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.