LADY AVALON

CMK2013-906-005 x LADYALICIA



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Früh verwendbar
Frühgrün ernte kann, zur sofortigen Verarbeitung.
Gute Resistenz gegen Kartoffelzystennematoden.
Frühe Entwicklung der Trockenmasse.
Gute Backqualität nach längerer Lagerung.



Eigenschaften

Knollenform	R	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	6,6 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	6,4	
Schalenfarbe	DY	
Fleischfarbe	7,4	

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	85	86	86
DM (%)	27,1	27,5	27,8
UWG	510	518	524
Knollen Ø (mm)	56	58	60

Ro1	9
Ro2/3	8
Ro5	1
Pa2	9
Pa3	7
TRV	7
Moptop-Virus	9

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

wz 1 (D1)	5
wz 2 (G1)	7
wz 6 (O1)	6
wz 18 (T1)	4

3 = Sehr anfällig, 10 = Immun

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	
Durchwuchs	8

Resistenz / Toleranz

Krautfäule	4
Knolle Krautfäule	5
Alternaria Knollenfäule	
Y-Virus	8
Yntn-virus	10
Blattrollenvirus	
Schwarzpunktkrankheit	
Silberschorf	
Metribuzin Vorauflauf	9
Metribuzin nach dem Auflaufen	5

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	3,8
Druckpunkte	
Fusarium (9 = Resistent, 1 = sehr anfällig)	6
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	7,7
Verarbeitungsfarbe im Februar*	7,5
verarbeitungsfarbe im Mai*	5,7

**Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel*
Backqualität Pommes/Chips: 8= sehr Gut, 3= Schlecht

Marktgängiger Ertrag

Schwarzfleckigkeit index (0-50)	31
HH (%)	5
IRS (%)	0
Waschfähigkeit	6
Schorf	7
Puderschorf	8
Äußere Beschädigungen	

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

08/12/2025

LADY AVALON

MEIJER POTATO

Pflanzen

Vorgekeimtes Pflanzgut, zehn Tage früher rodefähig.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
35/50	31 cm	26 cm	43000
50/60	37 cm	31 cm	36000

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.
Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff	Durchschnittlicher Bedarf für frühe Sorte	200	kg/ha	*Empfehlung basiert auf die*
Phosphat	Durchschnittlicher Bedarf	110	kg/ha	
Kali	Durchschnittlicher Bedarf	350	kg/ha	





Kali kurz vor dem Pflanzen und während des Wachstums verwenden, um Blaufleckigkeit zu verhindern.

Ernteschutz

Ernte und Lagerung

Frühgrün ernte kann, zur sofortigen Verarbeitung.
Vorsichtig roden, blauempfindlich.
Nach dem Roden sofort trocken belüften.
Gute Backqualität nach längerer Lagerung.

Lagerung:
7 °C
7 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte

Kali kurz vor dem Pflanzen und während des Wachstums verwenden, um Blaufleckigkeit zu verhindern.
Frühgrün ernte kann, zur sofortigen Verarbeitung.
Vorsichtig roden, blauempfindlich.
Gute Backqualität nach längerer Lagerung.

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.