LADY CHRISTL

WS73-3-391 x MANSOUR



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Exzellente Geschmack, Textur und Kochqualität.
Sehr frühe Sorte.
Sorte mit sehr hohem tuberization.
Gleichmäßige Knollengröße in hohen marktfähigen Erträgen.
Kann direkt ab Feld geerntet werden.



Eigenschaften

Knollenform	O	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	7,8	cm
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	8,0	
Schalenfarbe	Y	
Fleischfarbe	6,8	
Speisequalität	8 A	

A B C D

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	85	73	96
DM (%)	17,9	19,2	19,5
UWG	324	349	355
Knollen Ø (mm)	45	48	50

Ro1	9	●
Ro2/3		○
Ro5		○
Pa2		○
Pa3		○
TRV		○
Moptop-Virus	9	●

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

wz 1 (D1)	10	●
wz 2 (G1)		○
wz 6 (O1)	7	●
wz 18 (T1)		○

3 = Sehr anfällig, 10 = Immun

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz		○
Durchwuchs	8	●

Resistenz / Toleranz

Krautfäule	3
Knolle Krautfäule	3
Alternaria Knollenfäule	9
Y-Virus	9
Yntn-virus	10
Blattrollenvirus	7
Schwarzpunktkrankheit	7
Silberschorf	7
Metribuzin Vorauflauf	5
Metribuzin nach dem Auflaufen	5

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	3,3
Druckpunkte	
Fusarium (9 = Resistent, 1 = sehr anfällig)	6
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	4,7
Verarbeitungsfarbe im Februar*	3,2
verarbeitungsfarbe im Mai*	3,0

**Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel*
Backqualität Pommes/Chips: 8= sehr Gut, 3= Schlecht

Marktgängiger Ertrag

Schwarzfleckigkeit index (0-50)	10
HH (%)	0
IRS (%)	8
Waschfähigkeit	8
Schorf	8
Puderschorf	3
Äußere Beschädigungen	7

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

LADY CHRISTL

MEIJER POTATO

Pflanzen

Allein vorkeimen mit vorkeimsystem Joppe oder Vorkeimkisten.

Pflanzen im warme Boden um Rhizoctonia zu verhindern.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/30	18 cm	15 cm	74100
30/40	24 cm	20 cm	55600
40/50	30 cm	25 cm	44400
50/60	36 cm	30 cm	37000

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff	Durchschnittlicher Bedarf für frühe Sorte	150	kg/ha	*Empfehlung basiert auf die*
Phosphat	Durchschnittlicher Bedarf	110	kg/ha	
Kali	Durchschnittlicher Bedarf	230	kg/ha	



Stickstoff	100%
Phosphat	100%
Kali	100%

Achten Sie auf Magnesiummangel.

Ernteschutz

Etwas anfällig gegen Metribuzin.

Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.

Ernte und Lagerung

Kann direkt ab Feld geerntet werden.

Sorte nicht für Langzeitlagerung geeignet.

Lagerung:

4 °C

2 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sort

Pflanzen im warme Boden um Rhizoctonia zu verhindern.
Achten Sie auf Magnesiummangel.
Etwas anfällig gegen Metribuzin.
Kann direkt ab Feld geerntet werden.

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.