LADY CLAIRE

AGRIA x KW78-34-470



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Gute Backqualität nach längerer Lagerung.
Gleichmäßige Knollengröße in hohen marktfähigen Erträgen.
Sorte mit geringem Blauempfindlichkeit.
Gleichmäßig hohe Verarbeitungsqualität.



Eigenschaften

Knollenform	RO	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	7,2 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	7,6	
Schalenfarbe	DY	
Fleischfarbe	7,0	

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	62	69	69
DM (%)	21,1	23,3	23,0
UWG	389	433	426
Knollen Ø (mm)	47	54	51

Ro1	9	●
Ro2/3		○
Ro5		○
Pa2		○
Pa3		○
TRV	7	●
Moptop-Virus	9	●

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

wz 1 (D1)	10	●
wz 2 (G1)		○
wz 6 (O1)	8	●
wz 18 (T1)		○

3 = Sehr anfällig, 10 = Immun

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	7	●
Durchwuchs	7	●

Resistenz / Toleranz

Krautfäule	3 ●
Knolle Krautfäule	3 ●
Alternaria Knollenfäule	7 ●
Y-Virus	6 ●
Yntn-virus	7 ●
Blattrollenvirus	○
Schwarzpunktkrankheit	9 ●
Silberschorf	9 ●
Metribuzin Vorauflauf	7 ●
Metribuzin nach dem Auflaufen	9 ●

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	6,1
Druckpunkte	Anfällig
Fusarium (9 = Resistent, 1 = sehr anfällig)	8 ●
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	7,6 ●
Verarbeitungsfarbe im Februar*	7,7 ●
verarbeitungsfarbe im Mai*	7,3 ●

**Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel*
Backqualität Pommes/Chips: 8= sehr Gut, 3= Schlecht

Marktgängiger Ertrag

Schwarzfleckigkeit index (0-50)	12 ●
HH (%)	1 ●
IRS (%)	1 ●
Waschfähigkeit	6 ●
Schorf	7 ●
Puderschorf	8 ●
Äußere Beschädigungen	9 ●

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

LADY CLAIRE

MEIJER POTATO

Pflanzen

Pflanzgut vor Pflanzen ruhig halten und pflanzen Sie gleich aus Lager.
Pflanzen im warme Boden um Rhizoctonia zu verhindern.
In normaler Tiefe pflanzen.
Geeignet für Mineralböden.
Nur auf beregneten Parzellen anbauen.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	21 cm	18 cm	63500
35/55	33 cm	28 cm	40400
30/40	30 cm	25 cm	44400
40/50	35 cm	29 cm	38100
50/60	38 cm	32 cm	35100

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.
Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff	Höher Bedarf fur frühe Chips Sorte	250	kg/ha	*Empfehlung basiert auf die*
Phosphat	Durchschnittlicher Bedarf	110	kg/ha	
Kali	Höher Bedarf fur frühe Chips Sorte	350	kg/ha	



Stickstoff	70%	30%
Phosphat	100%	
Kali	70%	30%

Stickstoff Spaltung ist notwendig, um gute Erträge zu gewährleisten.
Kali kurz vor dem Pflanzen und während des Wachstums verwenden, um Blaufleckigkeit zu verhindern.

Ernteschutz

Anfällig für Metribuzin (volle Dosis) Vorauflauf.
Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.
Empfindlich für Alternaria, zeitig anfangen mit Alternariabekämpfung.
Eine häufige Magnesiumversorgung während des Wachstums trägt dazu bei, die Pflanzen gesund zu halten.

Ernte und Lagerung

Kurze Keimruhe; Nach der Ernte und Wundheilung schnell kühlen und
Temperatur stabil halten und mit Keimhemmung anfangen.
Sobald die Kartoffeln trocken sind Keimungsinhibitoren anwenden.

Lagerung:
6 °C
9 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sort

Nur auf beregneten Parzellen anbauen.
Stickstoff Spaltung ist notwendig, um gute Erträge zu gewährleisten.
Kali kurz vor dem Pflanzen und während des Wachstums verwenden, um Blaufleckigkeit zu verhindern.
Empfindlich für Alternaria, zeitig anfangen mit Alternariabekämpfung.
Sobald die Kartoffeln trocken sind Keimungsinhibitoren anwenden.

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.