LADY LUCE


LADYANNA x CMK2008-071-009



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Weißes Fleischfarbe, geeignet für das Premium-Segment.
Gibt hohe Erträge aus allen Bodentypen.
Exzellente Backfarbe während der gesamten Lagerzeit.
Robuste Pflanze, tolerant gegenüber klimatischem Stress und PCN.
Gleichmäßige Knollengröße in hohen marktfähigen Erträgen.
Sehr geringer Stickstoffbedarf.



Eigenschaften

Knollenform	LO	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	9,1 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	6,0	
Schalenfarbe	LY	
Fleischfarbe	4,7	
Speisequalität	7,9 AB	A B C D

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	105	110	109
DM (%)	20,1	21,3	21,3
UWG	369	393	391
Knollen Ø (mm)	52	57	56

Ro1	9
Ro2/3	6
Ro5	1
Pa2	9
Pa3	8
TRV	4
Moptop-Virus	9

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	4
wz 6 (O1)	5
wz 18 (T1)	1

3 = Sehr anfällig, 10 = Immun

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	7
Durchwuchs	7

Resistenz / Toleranz

Krautfäule	3
Knolle Krautfäule	5
Alternaria Knollenfäule	9
Y-Virus	7
Yntn-virus	8
Blattrollenvirus	
Schwarzpunktkrankheit	5
Silberschorf	5
Metribuzin Vorauflauf	9
Metribuzin nach dem Auflaufen	9

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	6,7
Druckpunkte	Ziemlich tolerant
Fusarium (9 = Resistent, 1 = sehr anfällig)	6
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	7,6
Verarbeitungsfarbe im Februar*	7,8
verarbeitungsfarbe im Mai*	7,8

**Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel*
Backqualität Pommes/Chips: 8= sehr Gut, 3= Schlecht

Marktgängiger Ertrag

Schwarzfleckigkeit index (0-50)	12
HH (%)	1
IRS (%)	6
Waschfähigkeit	6
Schorf	6
Puderschorf	7
Äußere Beschädigungen	

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

08/12/2025

LADY LUCE

MEIJER POTATO

Pflanzen

Auf Sandböden Risiko für die ABC-Krankheit (TNV)

Pflanzgut keimgestimmt pflanzen.

In normaler Tiefe pflanzen.

Schützen Sie die Sorte vor Schwarzer Punkt.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	36 cm	30 cm	37000
35/50	41 cm	34 cm	32500
50/60	48 cm	40 cm	27800
50/60 CUT	39 cm	33 cm	34200

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff	Geringer Bedarf für späte Sorte	200	kg/ha	*Empfehlung basiert auf die*
Phosphat	Durchschnittlicher Bedarf	110	kg/ha	
Kali	Durchschnittlicher Bedarf	350	kg/ha	



Stickstoff	100%
Phosphat	100%
Kali	100%

Geringer Stickstoffbedarf, ein zu hoher N-Gehalt verdrängt den TM-Anteil.

Alle Düngemittel vor oder zum Zeitpunkt der Pflanzung anwenden.

Ernteschutz

Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.

Ernte und Lagerung

Nach dem Roden sofort trocken belüften.

Lagerung:

7 °C

10 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sort

Auf Sandböden Risiko für die ABC-Krankheit (TNV)
Geringer Stickstoffbedarf, ein zu hoher N-Gehalt verdrängt den TM-Anteil.
Alle Düngemittel vor oder zum Zeitpunkt der Pflanzung anwenden.

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.