SOPRANO

SPUNTA x CMK1990-002-002



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Geeignet als Pommes-Frites- und Speisesorte.
Gleichmäßige Knollengröße in hohen marktfähigen Erträgen.
Exzellente Geschmack, Textur und Kochqualität.
Waschbare und attraktive Schale.



Eigenschaften

Knollenform	LO	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	8,8 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	7,3	
Schalenfarbe	Y	
Fleischfarbe	6,6	
Speisequalität	8 AB	A B C D

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	90	86	95
DM (%)	17,3	19,5	20,0
UWG	312	356	365
Knollen Ø (mm)	52	53	53

Ro1	2	●
Ro2/3		○
Ro5		○
Pa2		○
Pa3		○
TRV		○
Moptop-Virus	9	●

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

wz 1 (D1)	8	●
wz 2 (G1)		○
wz 6 (O1)	6	●
wz 18 (T1)		○

3 = Sehr anfällig, 10 = Immun

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	7	●
Durchwuchs	8	●

Resistenz / Toleranz

Krautfäule	3 ●
Knolle Krautfäule	5 ●
Alternaria Knollenfäule	7 ●
Y-Virus	6 ●
Yntn-virus	7 ●
Blattrollenvirus	○
Schwarzpunktkrankheit	7 ●
Silberschorf	7 ●
Metribuzin Vorauflauf	9 ●
Metribuzin nach dem Auflaufen	9 ●

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	4,6
Druckpunkte	ziemlich anfällig
Fusarium (9 = Resistent, 1 = sehr anfällig)	7 ●
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	6,7 ●
Verarbeitungsfarbe im Februar*	5,4 ●
verarbeitungsfarbe im Mai*	5,7 ●

**Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel*
Backqualität Pommes/Chips: 8= sehr Gut, 3= Schlecht

Marktgängiger Ertrag

Schwarzfleckigkeit index (0-50)	7 ●
HH (%)	0 ●
IRS (%)	0 ●
Waschfähigkeit	7 ●
Schorf	6 ●
Puderschorf	○
Äußere Beschädigungen	7 ●

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

08/12/2025

SOPRANO

MEIJER POTATO

Pflanzen

Pflanzgut vor Pflanzen ruhig halten und pflanzen Sie gleich aus Lager.
Pflanzkartoffeln nicht abkeimen.
Nicht anbauen auf Schorf anfälligen Boden.
Nur auf beregneten Parzellen anbauen.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	30 cm	25 cm	44400
35/45	34 cm	28 cm	39200
45/55	41 cm	34 cm	32500
35/55	40 cm	33 cm	33300
55/60	43 cm	36 cm	31000
60 +	44 cm	37 cm	30300

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.
Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff	Durchschnittlicher Bedarf für mittelfrühe Sorte	250	kg/ha	*Empfehlung basiert auf die*
Phosphat	Durchschnittlicher Bedarf	110	kg/ha	
Kali	Durchschnittlicher Bedarf	300	kg/ha	



Stickstoff	80%	20%
Phosphat	100%	
Kali	100%	

Ernteschutz

Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.
Bewässerung erhöht Knollansatz und gibt besseren Schale Qualität.

Ernte und Lagerung

Rechtzeitig Bewässerung aufhören damit die lenticels geschlossen werden können.
Das Wachstum der Knollen tritt ein zum Ende der Laubreife. Lass die Abreifung stattfinden für
Nach dem Roden sofort trocken belüften.
Kurze Keimruhe; Nach der Ernte und Wundheilung schnell kühlen und
Temperatur stabil halten und mit Keimhemmung anfangen.

Lagerung:
4 °C
6 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sort

Pflanzgut vor Pflanzen ruhig halten und pflanzen Sie gleich aus Lager.
Pflanzkartoffeln nicht abkeimen.
Nicht anbauen auf Schorf anfälligen Boden.
Rechtzeitig Bewässerung aufhören damit die lenticels geschlossen werden können.

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.