SOUND

MONDIAL x CMK2003-707-003



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Gibt hohe Erträge aus allen Bodentypen.
Gute Backqualität bis zur mittlere länge Lagerung.
Sehr schöne Schalequalität.
Trockenheitstolerante Sorte.



Eigenschaften

Knollenform	LO	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	8,7 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	6,5	
Schalenfarbe	Y	
Fleischfarbe	6,9	
Speisequalität	7,5 AB	A B C D

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	117	124	113
DM (%)	18,6	19,9	20,5
UWG	337	364	375
Knollen Ø (mm)	50	59	54

Ro1	9	●
Ro2/3	4	●
Ro5	8	●
Pa2	3	●
Pa3	2	●
TRV	8	●
Moptop-Virus	5	●

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

wz 1 (D1)	9	●
wz 2 (G1)		○
wz 6 (O1)	4	●
wz 18 (T1)	4	●

3 = Sehr anfällig, 10 = Immun

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	9	●
Durchwuchs	7	●

Resistenz / Toleranz

Krautfäule	9 ●
Knolle Krautfäule	5 ●
Alternaria Knollenfäule	9 ●
Y-Virus	○
Yntn-virus	7 ●
Blattrollenvirus	○
Schwarzpunktkrankheit	7 ●
Silberschorf	9 ●
Metribuzin Vorauflauf	7 ●
Metribuzin nach dem Auflaufen	9 ●

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	6,8
Druckpunkte	Ziemlich tolerant
Fusarium (9 = Resistent, 1 = sehr anfällig)	6 ●
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	6,3 ●
Verarbeitungsfarbe im Februar*	5,5 ●
verarbeitungsfarbe im Mai*	6,3 ●

**Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel*
Backqualität Pommes/Chips: 8= sehr Gut, 3= Schlecht

Marktgängiger Ertrag

Schwarzfleckigkeit index (0-50)	21 ●
HH (%)	0 ●
IRS (%)	1 ●
Waschfähigkeit	7 ●
Schorf	6 ●
Puderschorf	6 ●
Äußere Beschädigungen	5 ●

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

SOUND

MEIJER POTATO

Pflanzen

Pflanzkartoffeln nicht mit Talent (Carvon) lagern, da dies die Keimung stoppt.

In normaler Tiefe pflanzen.

Zu viel Bewässerung führt zu einem geringeren marktfähigen Ertrag.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	29 cm	24 cm	46000
35/45	36 cm	30 cm	37000
35/55	39 cm	33 cm	34200
45/55	40 cm	33 cm	33300
55/60	42 cm	35 cm	31700
60 +	43 cm	36 cm	31000

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff	Durchschnittlicher Bedarf für mittelspäte Sorte	200	kg/ha	*Empfehlung basiert auf die*
Phosphat	Durchschnittlicher Bedarf	110	kg/ha	
Kali	Durchschnittlicher Bedarf	350	kg/ha	



Stickstoff	100%
Phosphat	100%
Kali	100%

Verwenden Sie kein Kaliumchlorid, um einen niedrigen Trockensubstanzgehalt zu vermeiden.

Ernteschutz

Anfällig für Metribuzin (volle Dosis) Vorauflauf.

Phytophthora-Spritzen wie in der Praxis, mit einer vollen Dosis und einem normalen Intervall.

Bitte nicht bewässern zum Ende der Wachstum Periode, um Knollenverformung zu verhindern.

Ernte und Lagerung

Gut ausgereift roden.

Vermeiden Sie mechanische Schale beschädigung während das roden.

Sobald die Kartoffeln trocken sind Keimungsinhibitoren anwenden.

Sobald die Kartoffeln trocken sind Keimungsinhibitoren anwenden.

Sound bei mindestens 8 °C Verladen/Sortieren/Verpacken, um Beschädigungen zu vermeiden.

Lagerung:

7 °C

8 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte:

Zu viel Bewässerung führt zu einem geringeren marktfähigen Ertrag.
Verwenden Sie kein Kaliumchlorid, um einen niedrigen Trockensubstanzgehalt zu vermeiden.
Bitte nicht bewässern zum Ende der Wachstum Periode, um Knollenverformung zu verhindern.
Nach dem Roden sofort trocken belüften.
Sound bei mindestens 8 °C Verladen/Sortieren/Verpacken, um Beschädigungen zu vermeiden.

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.