CUPIDO

W72-22-496 x ESTIMA



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Variété facile à cultiver.
Bon rendement en récolte hâtive
Très belle qualité de présentation.



Caractéristiques

Forme du tubercule	RO	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	7,4 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	7,3	
Couleur de la peau	Y	
Couleur de la chair	7,3	
Qualité culinaire	8 A	A B C D

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	84	59	126
MS (%)	18,5	20,3	19,6
PSE	336	372	357
Calibre (Ø mm)	49	58	49

Ro1	9	●
Ro2/3		○
Ro5		○
Pa2		○
Pa3		○
TRV		○
Virus du Moptop		○

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	9	●
wz 2 (G1)		○
wz 6 (O1)	7	●
wz 18 (T1)		○

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec		○
Repousse	7	●

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	3 ●
Mildiou du tubercule	○
Alternaria	9 ●
Virus-Y	9 ●
Virus-Yntn	10 ●
Virus de l'enroulement	○
Dartrose	
Gale argentée	
Métribuzine en pré-levée	
Métribuzine en post-levée	

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	6,0
Points de compression	
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	6 ●
Fritabilité/chipabilité en octobre*	5,0 ●
Fritabilité/chipabilité en février*	4,2 ●
Fritabilité/chipabilité en mai*	4,3 ●

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*
Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	16 ●
Cœurs creux (%)	2 ●
Tâches de rouille (%)	1 ●
Lavabilité	8 ●
Gale commune	6 ●
Gale poudreuse	○
Chocs de type fracture	○

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

CUPIDO

MEIJER POTATO

Plantation

Ne pas planter trop tôt dans un sol trop froid (> 8° C).

Eviter une germination trop importante.

Ne pas cultiver en sols sensibles a la gale commune.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	18 cm	15 cm	74100
35/55	28 cm	23 cm	47600
55/60	38 cm	32 cm	35100
60 +	41 cm	34 cm	32500

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N) Azote:	Besoins élevés pour une variété demi-précoce	230	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5) Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O) Potasse:	Besoins moyens	300	kg/ha	



(N) Azote:	80%	20%
(P2O5) Phosphate:	100%	
(K2O) Potasse:	100%	

Protection des cultures

Légèrement sensible au Metribuzin.

Récolte et stockage

Sensible à la fusariose.

Attendre que la peau se soit bien formée avant d'arracher.

Attention aux chocs mécaniques lors de l'arrachage.

Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.

Stockage:

4 °C

7 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Ne pas planter trop tôt dans un sol trop froid (> 8° C).
Eviter une germination trop importante.
Légèrement sensible au Metribuzin.
Attendre que la peau se soit bien formée avant d'arracher.
Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils