LADY ALICIA

PIROL x PIKE



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Plante robuste et tolérante aux stress climatiques.
Haut potentiel de rendement dans tous les types de sols.
Bonne qualité de cuisson après un stockage long terme.
Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.



Caractéristiques

Forme du tubercule	RO	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	7,0 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	6,4	
Couleur de la peau	DY	
Couleur de la chair	6,9	

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	80	93	82
MS (%)	23,3	24,8	24,9
PSE	433	462	466
Calibre (Ø mm)	51	57	53

Ro1	9
Ro2/3	1
Ro5	6
Pa2	2
Pa3	1
TRV	7
Virus du Moptop	9

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	4
wz 2 (G1)	4
wz 6 (O1)	4
wz 18 (T1)	4

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7
Repousse	7

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	3
Mildiou du tubercule	5
Alternaria	9
Virus-Y	6
Virus-Yntn	8
Virus de l'enroulement	7
Dartrose	7
Gale argentée	7
Métribuzine en pré-levée	7
Métribuzine en post-levée	7

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	4,2
Points de compression	Plutôt sensible
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	6
Fritabilité/chipabilité en octobre*	7,7
Fritabilité/chipabilité en février*	7,5
Fritabilité/chipabilité en mai*	5,7

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*
Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	10
Cœurs creux (%)	2
Tâches de rouille (%)	0
Lavabilité	6
Gale commune	8
Gale poudreuse	8
Chocs de type fracture	5

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

08/12/2025

LADY ALICIA

MEIJER POTATO

Plantation

Pour une bonne tubérisation, attendre que le plant soit au stade points blancs.

Ne pas égermer avant plantation.

Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.

Planter à une profondeur normale.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
30/40	29 cm	24 cm	46000
40/50	34 cm	28 cm	39200
30/50	31 cm	26 cm	43000
50/60	37 cm	31 cm	36000

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété chipable de maturité moyenne	200	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins moyens	350	kg/ha	



(N)	Azote:	100%
(P2O5)	Phosphate:	100%
(K2O)	Potasse:	100%

Les apports en azote ne doivent pas être fractionnés afin de permettre la bonne maturité des tubercules.

Protection des cultures

Démarrer le contrôle anti-mildiou à temps.

L'hydrazide maleique aide à réduire la pression germinative.

S'assurer de la bonne maturité des tubercules pour assurer une bonne couleur de cuisson

Récolte et stockage

Adaptée à un arrachage en vert et transformation directe (10 jours plus tard que LR).

Dormance courte, après récolte et cicactrisation, abaisser rapidement

la température, la maintenir stable et débuter les anti-germinatifs.

Le contrôle curatif des germes peut entraîner une germination interne. Privilégiez le contrôle préventif.

Un abaissement de 0,25°C/jour (maximum) permet de limiter la formation de sucres lors du refroidissement de LADY ALICIA.

Stockage:

8 °C

8 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Les apports en azote ne doivent pas être fractionnés afin de permettre la bonne maturité des tubercules.
S'assurer de la bonne maturité des tubercules pour assurer une bonne couleur de cuisson
Le contrôle curatif des germes peut entraîner une germination interne. Privilégiez le contrôle préventif.
Un abaissement de 0,25°C/jour (maximum) permet de limiter la formation de sucres lors du refroidissement de LADY ALICIA.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils