LADY LUCE


LADYANNA x CMK2008-071-009



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Variété adaptée pour le marché premium (chair et forme).
Haut potentiel de rendement dans tous les types de sols.
Excellente couleur de frite pendant tout le stockage.
Variété robuste, tolérante aux stress climatiques et aux nématodes à kyste
Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.
Très faibles besoins en azote.



Caractéristiques

Forme du tubercule	LO	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	9,1 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	6,0	
Couleur de la peau	LY	
Couleur de la chair	4,7	
Qualité culinaire	7,9 AB	A B C D

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	3
Mildiou du tubercule	5
Alternaria	9
Virus-Y	7
Virus-Yntn	8
Virus de l'enroulement	
Dartrose	5
Gale argentée	5
Métribuzine en pré-levée	9
Métribuzine en post-levée	9

1 = très sensible à 9 = résistant

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	105	110	109
MS (%)	20,1	21,3	21,3
PSE	369	393	391
Calibre (Ø mm)	52	57	56

Ro1	9
Ro2/3	6
Ro5	1
Pa2	9
Pa3	8
TRV	4
Virus du Moptop	9

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	4
wz 6 (O1)	5
wz 18 (T1)	1

3 = très sensible à 10 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	6,7
Points de compression	Plutôt tolérante
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	6
Fritabilité/chipabilité en octobre*	7,6
Fritabilité/chipabilité en février*	7,8
Fritabilité/chipabilité en mai*	7,8

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*
Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7
Repousse	7

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	12
Cœurs creux (%)	1
Tâches de rouille (%)	6
Lavabilité	6
Gale commune	6
Gale poudreuse	7
Chocs de type fracture	

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

08/12/2025

LADY LUCE

MEIJER POTATO

Plantation

Eviter les sols sujets au virus du rattle du tabac (TRV).

Attendre le "stade points blancs" avant de planter.

Planter à une profondeur normale.

Un traitement contre la dartrose est conseillé.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	36 cm	30 cm	37000
35/50	41 cm	34 cm	32500
50/60	48 cm	40 cm	27800
50/60 CUT	39 cm	33 cm	34200

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins faibles pour une variété tardive	200	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins moyens	350	kg/ha	



(N)	Azote:	100%
(P2O5)	Phosphate:	100%
(K2O)	Potasse:	100%

Faibles besoins azotés, en cas d'apport trop important la matière sèche sera faible.

Les apports en azote doivent être réalisés au plus tard lors de la plantation.

Protection des cultures

Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.

Récolte et stockage

Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.

Stockage:

7 °C

10 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Eviter les sols sujets au virus du rattle du tabac (TRV).
Faibles besoins azotés, en cas d'apport trop important la matière sèche sera faible.
Les apports en azote doivent être réalisés au plus tard lors de la plantation.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils