LADY ROSETTA


CARDINAL x (VTN)262-33-3



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

La variété la plus précoce du marché.
Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.
Variété à matière sèche élevée.
Bons rendements en récolte précoce et à maturité.



Caractéristiques

Forme du tubercule	R	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	6,4 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	6,7	
Couleur de la peau	R	
Couleur de la chair	6,2	

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	71	87	81
MS (%)	23,7	24,2	24,5
PSE	440	451	457
Calibre (Ø mm)	51	60	56

Ro1	9	●
Ro2/3		○
Ro5		○
Pa2	2	●
Pa3	2	●
TRV	8	●
Virus du Moptop	3	●

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	9	●
wz 2 (G1)		○
wz 6 (O1)	7	●
wz 18 (T1)		○

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7	●
Repousse	7	●

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	3 ●
Mildiou du tubercule	3 ●
Alternaria	9 ●
Virus-Y	8 ●
Virus-Yntn	7 ●
Virus de l'enroulement	7 ●
Dartrose	7 ●
Gale argentée	7 ●
Métribuzine en pré-levée	9 ●
Métribuzine en post-levée	9 ●

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	4,1
Points de compression	
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	7 ●
Fritabilité/chipabilité en octobre*	6,6 ●
Fritabilité/chipabilité en février*	5,6 ●
Fritabilité/chipabilité en mai*	4,3 ●

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*
Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	38 ●
Cœurs creux (%)	3 ●
Tâches de rouille (%)	5 ●
Lavabilité	5 ●
Gale commune	7 ●
Gale poudreuse	8 ●
Chocs de type fracture	3 ●

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

08/12/2025

LADY ROSETTA

MEIJER POTATO

Plantation

La prégermination avance la récolte de 10 jours.

Traiter le plant contre le rhizoctone et la gale argentée.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	19 cm	16 cm	70200
35/50	27 cm	23 cm	49400
50/60	39 cm	33 cm	34200
35/55	29 cm	24 cm	46000
55/60	40 cm	33 cm	33300
60 +	41 cm	34 cm	32500

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété précoce	220	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins moyens	330	kg/ha	



(N) Azote: 100%

(P2O5) Phosphate: 100%

(K2O) Potasse: 70% 30%

Les apports en potasse sont préconisés au printemps ET en culture afin de minimiser le risque de chocs internes.

Nous préconisons un apport fractionné en potasse (K) afin de réduire le risque de chocs internes.

Protection des cultures

Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.

Démarrer le contrôle anti-mildiou à temps.

Récolte et stockage

Récolter avec précaution, sensible aux chocs.

Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.

Variété non adaptée au stockage long-terme.

Stockage:

8 °C

4 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Les apports en potasse sont préconisés au printemps ET en culture afin de minimiser le risque de chocs internes.
Nous préconisons un apport fractionné en potasse (K) afin de réduire le risque de chocs internes.
Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.
Récolter avec précaution, sensible aux chocs.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils