MELODY

VE7445 x W72-22-496



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Haut potentiel de rendement dans tous les types de sols.
Plante robuste et tolérante aux stress climatiques.
Pomme de terre savoureuse à faibles intrants.
Peu sensible à la gâle commune.
Adaptée au stockage en vrac et peu sensible aux chocs.



Caractéristiques

Forme du tubercule	RO	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	7,2 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	5,7	
Couleur de la peau	Y	
Couleur de la chair	7,1	
Qualité culinaire	8 B	

A B C D

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	108	96	97
MS (%)	19,5	20,0	20,6
PSE	356	365	378
Calibre (Ø mm)	57	61	57

Ro1	9
Ro2/3	4
Ro5	
Pa2	5
Pa3	1
TRV	5
Virus du Moptop	5

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	9
wz 6 (O1)	9
wz 18 (T1)	4

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	9
Repousse	8

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	4
Mildiou du tubercule	5
Alternaria	9
Virus-Y	8
Virus-Yntn	10
Virus de l'enroulement	
Dartrose	7
Gale argentée	9
Métribuzine en pré-levée	7
Métribuzine en post-levée	9

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	7,1
Points de compression	Tolérante
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	6
Fritabilité/chipabilité en octobre*	4,8
Fritabilité/chipabilité en février*	3,7
Fritabilité/chipabilité en mai*	4,3

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*
Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	12
Cœurs creux (%)	1
Tâches de rouille (%)	6
Lavabilité	7
Gale commune	7
Gale poudreuse	8
Chocs de type fracture	7

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

08/12/2025

MELODY

MEIJER POTATO

Plantation

Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.

Planter à une profondeur normale.

Traiter le plant contre le rhizoctone et la gale argentée.

Un taux élevé de matière organique favorise les défauts internes.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	21 cm	18 cm	63500
35/50	30 cm	25 cm	44400
35/55	33 cm	28 cm	40400
50/60	38 cm	32 cm	35100
55/60	40 cm	33 cm	33300

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété demi-tardive	230	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins moyens	300	kg/ha	



(N)	Azote:	100%
(P2O5)	Phosphate:	100%
(K2O)	Potasse:	100%

Ne pas apporter d'azote trop tard.

Attention aux carences en magnesie et l'application de Bore est nécessaire afin de limiter l'apparition de défauts internes..

Protection des cultures

Sensible à la dose de 450 g/ha de Métribuzine en pre-levée.

Démarrer le contrôle anti-mildiou à temps.

Des précipitations après un épisode de sec peuvent provoquer la croissance du feuillage: attention au mildiou,

Récolte et stockage

Le défanage doit être correctement réalisé afin d'assurer un bon stockage.

Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.

Stockage:

5 °C

8 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.
Ne pas apporter d'azote trop tard.
Attention aux carences en magnesie.
Sensible à la dose de 450 g/ha de Métribuzine en pre-levée.
Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils