MUSICA

CMK1993-042-005 x LADYCHRISTL



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Goût, texture et tenue à la cuisson excellents.
Tolérante aux stress climatiques.
Variété adaptée aux zones précoces et non précoces.
Bon rendement en récolte hâtive



Caractéristiques

Forme du tubercule	LO	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	8,5 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	6,9	
Couleur de la peau	DY	
Couleur de la chair	7,5	
Qualité culinaire	8 A	A B C D

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	116	112	109
MS (%)	18,4	19,3	19,5
PSE	333	352	356
Calibre (Ø mm)	49	54	52

Ro1	9	●
Ro2/3	8	●
Ro5	9	●
Pa2	6	●
Pa3	3	●
TRV		○
Virus du Moptop	9	●

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	10	●
wz 2 (G1)	4	●
wz 6 (O1)	4	●
wz 18 (T1)	4	●

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7	●
Repousse	8	●

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	4	●
Mildiou du tubercule	5	●
Alternaria	7	●
Virus-Y	8	●
Virus-Yntn	10	●
Virus de l'enroulement	7	●
Dartrose	5	●
Gale argentée	5	●
Métribuzine en pré-levée	9	●
Métribuzine en post-levée	9	●

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	2,0	
Points de compression		
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	8	●
Fritabilité/chipabilité en octobre*	4,1	●
Fritabilité/chipabilité en février*	3,4	●
Fritabilité/chipabilité en mai*	3,0	●

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*
Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	10	●
Cœurs creux (%)	0	●
Tâches de rouille (%)	4	●
Lavabilité	6	●
Gale commune	7	●
Gale poudreuse		○
Chocs de type fracture	7	●

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

MUSICA

MEIJER POTATO

Plantation

Prégermination avant plantation possible, dans des conditions appropriées.

Traiter le plant contre le rhizoctone et la gale argentée.

Tubérisation précoce.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	20 cm	17 cm	66700
35/45	26 cm	22 cm	51300
35/55	30 cm	25 cm	44400
45/55	32 cm	27 cm	41700
55/60	37 cm	31 cm	36000
60 +	39 cm	33 cm	34200

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété demi-précoce	225	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins moyens	300	kg/ha	



(N)	Azote:	90%	10%
(P2O5)	Phosphate:	100%	
(K2O)	Potasse:	100%	

Protection des cultures

Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.

Récolte et stockage

Ne pas attendre la maturité avant défanage afin d'optimiser la qualité de présentation.

Retarder le défanage donnera de bons rendements, au détriment de la qualité de peau.

Stockage:

4 °C

6 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Prégermination avant plantation possible, dans des conditions appropriées.
Tubérisation précoce.
Ne pas attendre la maturité avant défanage afin d'optimiser la qualité de présentation.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils