SOPRANO

SPUNTA x CMK1990-002-002



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Utilisation en frites et consommation.
Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.
Goût, texture et tenue à la cuisson excellents.
Très belle qualité de présentation.



Caractéristiques

Forme du tubercule	LO	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	8,8 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	7,3	
Couleur de la peau	Y	
Couleur de la chair	6,6	
Qualité culinaire	8 AB	A B C D

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	90	86	95
MS (%)	17,3	19,5	20,0
PSE	312	356	365
Calibre (Ø mm)	52	53	53

Ro1	2	●
Ro2/3		○
Ro5		○
Pa2		○
Pa3		○
TRV		○
Virus du Moptop	9	●

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	8	●
wz 2 (G1)		○
wz 6 (O1)	6	●
wz 18 (T1)		○

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7	●
Repousse	8	●

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	3 ●
Mildiou du tubercule	5 ●
Alternaria	7 ●
Virus-Y	6 ●
Virus-Yntn	7 ●
Virus de l'enroulement	○
Dartrose	7 ●
Gale argentée	7 ●
Métribuzine en pré-levée	9 ●
Métribuzine en post-levée	9 ●

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	4,6
Points de compression	Plutôt sensible
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	7 ●
Fritabilité/chipabilité en octobre*	6,7 ●
Fritabilité/chipabilité en février*	5,4 ●
Fritabilité/chipabilité en mai*	5,7 ●

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*
Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	7 ●
Cœurs creux (%)	0 ●
Tâches de rouille (%)	0 ●
Lavabilité	7 ●
Gale commune	6 ●
Gale poudreuse	○
Chocs de type fracture	7 ●

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

08/12/2025

SOPRANO

MEIJER POTATO

Plantation

Garder les plants dans au frais avant plantation, afin d'éviter leur germination.
Ne pas égermer avant plantation.
Ne pas cultiver en sols sensibles a la gale commune.
Uniquement dans les champs qui peuvent être irrigués.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	30 cm	25 cm	44400
35/45	34 cm	28 cm	39200
45/55	41 cm	34 cm	32500
35/55	40 cm	33 cm	33300
55/60	43 cm	36 cm	31000
60 +	44 cm	37 cm	30300

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.
Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété demi-précoce	250	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins moyens	300	kg/ha	



(N)	Azote:	80%	20%
(P2O5)	Phosphate:	100%	
(K2O)	Potasse:	100%	

Protection des cultures

Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.
L'irrigation premet de maintenir une bonne tubérisation et qualité de présentation.

Récolte et stockage

Un arrêt de l'irrigation avant défanage est nécessaire à la fermeture des lenticelles.
Les tubercules grossissent lorsque le feuillage est en sénescence; laissez la sénescence se proc
Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.
Dormance courte, après récolte et cicactrisation, abaisser rapidement
la température, la maintenir stable et débuter les anti-germinatifs.

Stockage:
4 °C
6 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Garder les plants dans au frais avant plantation, afin d'éviter leur germination.
Ne pas égermer avant plantation.
Ne pas cultiver en sols sensibles a la gale commune.
Un arrêt de l'irrigation avant défanage est nécessaire à la fermeture des lenticelles.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils