SOUND

MONDIAL x CMK2003-707-003



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Variété tolérante au stress hydrique.
Très belle qualité de présentation.
Haut potentiel de rendement dans tous les types de sols.
Parfaite pour un usage en frites ménagères.



Caractéristiques

Forme du tubercule	LO	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	8,7 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	6,5	
Couleur de la peau	Y	
Couleur de la chair	6,9	
Qualité culinaire	7,5 AB	

A B C D

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	117	124	113
MS (%)	18,6	19,9	20,5
PSE	337	364	375
Calibre (Ø mm)	50	59	54

Ro1	9
Ro2/3	4
Ro5	8
Pa2	3
Pa3	2
TRV	8
Virus du Moptop	5

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	9
wz 2 (G1)	
wz 6 (O1)	4
wz 18 (T1)	4

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7
Repousse	7

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	9
Mildiou du tubercule	5
Alternaria	9
Virus-Y	
Virus-Yntn	7
Virus de l'enroulement	
Dartrose	7
Gale argentée	9
Métribuzine en pré-levée	7
Métribuzine en post-levée	9

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	6,8
Points de compression	Plutôt tolérante
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	6
Fritabilité/chipabilité en octobre*	6,3
Fritabilité/chipabilité en février*	5,5
Fritabilité/chipabilité en mai*	6,3

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*
Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	21
Cœurs creux (%)	0
Tâches de rouille (%)	1
Lavabilité	7
Gale commune	6
Gale poudreuse	6
Chocs de type fracture	5

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

SOUND

MEIJER POTATO

Plantation

Ne pas stocker les plants dans un environnement avec du Talent.

Planter à une profondeur normale.

Une irrigation trop importante diminuera la qualité du produit.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	29 cm	24 cm	46800
35/45	35 cm	29 cm	38100
35/55	38 cm	32 cm	35100
45/55	39 cm	33 cm	34200
55/60	42 cm	35 cm	31700
60 +	43 cm	36 cm	31000

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété demi-tardive	200	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins moyens	350	kg/ha	



(N)	Azote:	100%
(P2O5)	Phosphate:	100%
(K2O)	Potasse:	100%

Eviter d'appliquer du potassium sous forme chlorure, afin de conserver la matière sèche.

Protection des cultures

Sensible à la dose de 450 g/ha de Métribuzine en pre-levée.

Lutte contre le mildiou comme d'habitude : pulvérisez lorsqu'il y a un risque, à dose complète et à fréquence recommandée.

Ne pas arroser en fin de cycle afin d'éviter l'apparition de déformations des tubercules.

Récolte et stockage

Attendre que la peau se soit bien formée avant d'arracher.

Attention aux chocs mécaniques lors de l'arrachage.

Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.

Dès que les tubercules sont secs, appliquer un antigerminatif.

Pour éviter les chocs externes, toute manipulation doit être effectuée au-dessus de 8°C.

Stockage:

7 °C

8 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Une irrigation trop importante diminuera la qualité du produit.
Eviter d'appliquer du potassium sous forme chlorure, afin de conserver la matière sèche.
Ne pas arroser en fin de cycle afin d'éviter l'apparition de déformations des tubercules.
Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.
Pour éviter les chocs externes, toute manipulation doit être effectuée au-dessus de 8°C.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils