COUNTRY


MELODY x SOUND



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Klimaanpassungsfähig.
Gleichmäßige Knollengröße in hohen marktfähigen Erträgen.
Schmackhafte Speisesorte.
Sehr konstante Leistung auf den Feldern.
Geeignet für eine Vielzahl kulinarischer Endmärkte.
Stark gegen vielfältig Schale Qualitätsprobleme.



Eigenschaften

Knollenform	RO	
Knollen/Pflanze	14	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	7,5 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	6,4	
Schalenfarbe	Y	
Fleischfarbe	6,7	
Speisequalität	7,9 B	A B C D

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	112	106	102
DM (%)	19,4	20,1	20,5
UWG	353	367	377
Knollen Ø (mm)	53	57	56

Ro1	9
Ro2/3	3
Ro5	1
Pa2	5
Pa3	1
TRV	7
Moptop-Virus	5

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

wz 1 (D1)	9
wz 2 (G1)	6
wz 6 (O1)	6
wz 18 (T1)	5

3 = Sehr anfällig, 10 = Immun

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	7
Durchwuchs	8

Resistenz / Toleranz

Krautfäule	2
Knolle Krautfäule	
Alternaria Knollenfäule	7
Y-Virus	8
Yntn-virus	
Blattrollenvirus	
Schwarzpunktkrankheit	9
Silberschorf	9
Metribuzin Vorauflauf	9
Metribuzin nach dem Auflaufen	7

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	6,0
Druckpunkte	
Fusarium (9 = Resistent, 1 = sehr anfällig)	8
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	6,8
Verarbeitungsfarbe im Februar*	6,5
verarbeitungsfarbe im Mai*	4,7

**Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel*
Backqualität Pommes/Chips: 8= sehr Gut, 3= Schlecht

Marktgängiger Ertrag

Schwarzfleckigkeit index (0-50)	8
HH (%)	0
IRS (%)	3
Waschfähigkeit	7
Schorf	7
Puderschorf	8
Äußere Beschädigungen	7

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

COUNTRY

MEIJER POTATO

Pflanzen

Pflanzgut keimgestimmt pflanzen.

In normaler Tiefe pflanzen.

Feldern mit mop-top geschichte vermeiden

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	22 cm	18 cm	60600
35/50	35 cm	29 cm	38100
50/60	41 cm	34 cm	32500

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff	Durchschnittlicher Bedarf für mittelfrühe Sorte	230	kg/ha	*Basiert auf die NL*
Phosphat	Durchschnittlicher Bedarf	110	kg/ha	
Kali	Durchschnittlicher Bedarf	350	kg/ha	



Stickstoff	80%	20%
Phosphat	100%	
Kali	100%	

Ernteschutz

Anfällig für die Verwendung von 150 g / ha Metribuzin nach dem Auflaufen.

Für eine hübsche, glatte Schale und gute Knollenform, den Bestand zeitig abtöten.

Ernte und Lagerung

Beste Krautabtötung bei einem abreifenden Gewächs.

Nach dem Roden sofort trocken belüften.

Für Pommes Frites zu Hause Segment bitte bei 7 °C lagern.

Lagerung:

5 °C

8 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte:

Anfällig für die Verwendung von 150 g / ha Metribuzin nach dem Auflaufen.
Für eine hübsche, glatte Schale und gute Knollenform, den Bestand zeitig abtöten.
Für Pommes Frites zu Hause Segment bitte bei 7 °C lagern.

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

02/11/2026