LADY AMARILLA

AGRIA x HERMES



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Gute Backqualität nach längerer Lagerung.
Gleichmäßige Knollengröße in hohen marktfähigen Erträgen.
Sorte mit geringem Blauempfindlichkeit.
Lange Keimruhe für lange Lagerung geeignet.



Eigenschaften

Knollenform	O
Knollen/Pflanze	11
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	8,2 cm
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	7,3
Schalenfarbe	DY
Fleischfarbe	7,1
	-

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	78	77	79
DM (%)	20,5	21,7	21,4
UWG	377	400	394
Knollen Ø (mm)	48	54	53

Ro1	1
Ro2/3	1
Ro5	
Pa2	1
Pa3	1
TRV	8
Moptop-Virus	9

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	4
wz 6 (O1)	5
wz 18 (T1)	4

3 = Sehr anfällig, 10 = Immun

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	7
Durchwuchs	8

Resistenz / Toleranz

Krautfäule	4
Knolle Krautfäule	5
Alternaria Knollenfäule	5
Y-Virus	8
Yntn-virus	7
Blattrollenvirus	
Schwarzpunktkrankheit	7
Silberschorf	7
Metribuzin Vorauflauf	9
Metribuzin nach dem Auflaufen	9

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	7,7
Druckpunkte	Ziemlich tolerant
Fusarium (9 = Resistent, 1 = sehr anfällig)	5
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	7,4
Verarbeitungsfarbe im Februar*	7,9
verarbeitungsfarbe im Mai*	7,8

**Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel*

Backqualität Pommes/Chips: 8= sehr Gut, 3= Schlecht

Marktgängiger Ertrag

Schwarzfleckigkeit index (0-50)	2
HH (%)	0
IRS (%)	0
Waschfähigkeit	6
Schorf	7
Puderschorf	8
Äußere Beschädigungen	7

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

02/11/2026

LADY AMARILLA

MEIJER POTATO

Pflanzen

Nicht zu früh pflanzen im kalten Boden (> 8° C).
Pflanzgut keimgestimmt pflanzen.
Pflanzkartoffeln nicht abkeimen.
Nicht anbauen auf Schwere Böden.
Geeignet für Mineralböden.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
30/40	31 cm	26 cm	43000
40/50	35 cm	29 cm	38100
35/55	33 cm	28 cm	40400
50/60	39 cm	33 cm	34200

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.
Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff	Durchschnittlicher Bedarf für Chips Sorte mit mittlere Abreifung	250	kg/ha	*Basiert auf die NL*
Phosphat	Durchschnittlicher Bedarf	110	kg/ha	
Kali	Durchschnittlicher Bedarf	300	kg/ha	



Stickstoff	70%	30%
Phosphat	100%	
Kali	100%	

Stickstoff Spaltung ist notwendig, um gute Erträge zu gewährleisten.
Verwenden Sie kein Kaliumchlorid, um einen niedrigen Trockensubstanzgehalt zu vermeiden.

Ernteschutz

Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.
Schützen Sie die Pflanzen bei hohem Blattlausdruck.

Ernte und Lagerung

Mutterknolle muss ganz verschwunden sein vor der Ernte.
Nach dem Roden sofort trocken belüften.

Lagerung:
7 °C
9 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte:

Nicht zu früh pflanzen im kalten Boden (> 8° C).
Pflanzgut keimgestimmt pflanzen.
Verwenden Sie kein Kaliumchlorid, um einen niedrigen Trockensubstanzgehalt zu vermeiden.
Stickstoff Spaltung ist notwendig, um gute Erträge zu gewährleisten.
Mutterknolle muss ganz verschwunden sein vor der Ernte.

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

02/11/2026