LADY AVALON

CMK2013-906-005 x LADYALICIA



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Früh verwendbar
Frühgrün ernte kann, zur sofortigen Verarbeitung.
Gute Backqualität nach längerer Lagerung.
Frühe Entwicklung der Trockenmasse.
Gute Resistenz gegen Kartoffelzystennematoden.



Eigenschaften

Knollenform	R	
Knollen/Pflanze	12	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	6,6 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	6,4	
Schalenfarbe	DY	
Fleischfarbe	7,4	

Resistenz / Toleranz

Krautfäule	2
Knolle Krautfäule	5
Alternaria Knollenfäule	8
Y-Virus	8
Yntn-virus	9
Blattrollenvirus	
Schwarzpunktkrankheit	6
Silberschorf	7
Metribuzin Vorauflauf	9
Metribuzin nach dem Auflaufen	7

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	85	86	86
DM (%)	27,1	27,5	27,8
UWG	510	518	524
Knollen Ø (mm)	56	58	60

Ro1	9
Ro2/3	6
Ro5	2
Pa2	8
Pa3	7
TRV	7
Moptop-Virus	9

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

wz 1 (D1)	5
wz 2 (G1)	7
wz 6 (O1)	6
wz 18 (T1)	4

3 = Sehr anfällig, 10 = Immun

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	3,8
Druckpunkte	
Fusarium (9 = Resistent, 1 = sehr anfällig)	6
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	7,7
Verarbeitungsfarbe im Februar*	7,5
verarbeitungsfarbe im Mai*	5,7

**Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel*
Backqualität Pommes/Chips: 8= sehr Gut, 3= Schlecht

Marktgängiger Ertrag

Schwarzfleckigkeit index (0-50)	31
HH (%)	5
IRS (%)	0
Waschfähigkeit	6
Schorf	7
Puderschorf	8
Äußere Beschädigungen	5

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	7
Durchwuchs	8

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

LADY AVALON

MEIJER POTATO

Pflanzen

Vorgekeimtes Pflanzgut, zehn Tage früher rodefähig.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	21 cm	18 cm	63500
35/55	32 cm	27 cm	41700
30/40	29 cm	24 cm	46000
40/50	34 cm	28 cm	39200
50/60	37 cm	31 cm	36000

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.
Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff	Durchschnittlicher Bedarf für frühe Sorte	200	kg/ha	*Basiert auf die NL*
Phosphat	Durchschnittlicher Bedarf	110	kg/ha	
Kali	Durchschnittlicher Bedarf	350	kg/ha	



Stickstoff	100%	
Phosphat	100%	
Kali	70%	30%

Kali kurz vor dem Pflanzen und während des Wachstums verwenden, um Blaufleckigkeit zu verhindern.

Ernteschutz

Ernte und Lagerung

Frühgrün ernte kann, zur sofortigen Verarbeitung.
Vorsichtig roden, blauempfindlich.
Nach dem Roden sofort trocken belüften.
Gute Backqualität nach längerer Lagerung.

Lagerung:
7 °C
9 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte:

Kali kurz vor dem Pflanzen und während des Wachstums verwenden, um Blaufleckigkeit zu verhindern.
Frühgrün ernte kann, zur sofortigen Verarbeitung.
Vorsichtig roden, blauempfindlich.
Gute Backqualität nach längerer Lagerung.

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

02/11/2026