LADY ROSETTA


CARDINAL x (VTN)262-33-3



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Die früheste Chips-Sorte auf dem Markt.
Kann direkt ab Feld geerntet werden.
Sorte mit hohem Trockensubstanzgehalt.
Guter Ertrag in der Früh- und Haupternte.



Eigenschaften

Knollenform	R	
Knollen/Pflanze	12	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	6,4	cm
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	6,7	
Schalenfarbe	R	
Fleischfarbe	6,2	

Resistenz / Toleranz

Krautfäule	3
Knolle Krautfäule	3
Alternaria Knollenfäule	9
Y-Virus	8
Yntn-virus	7
Blattrollenvirus	7
Schwarzpunktkrankheit	7
Silberschorf	7
Metribuzin Vorauflauf	9
Metribuzin nach dem Auflaufen	9

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	71	87	81
DM (%)	23,7	24,2	24,5
UWG	440	451	457
Knollen Ø (mm)	51	60	56

Ro1	9
Ro2/3	6
Ro5	
Pa2	2
Pa3	2
TRV	8
Moptop-Virus	3

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

wz 1 (D1)	9
wz 2 (G1)	
wz 6 (O1)	7
wz 18 (T1)	

3 = Sehr anfällig, 10 = Immun

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	4,1
Druckpunkte	
Fusarium (9 = Resistent, 1 = sehr anfällig)	8
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	6,6
Verarbeitungsfarbe im Februar*	5,6
verarbeitungsfarbe im Mai*	4,3

**Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel*
Backqualität Pommes/Chips: 8= sehr Gut, 3= Schlecht

Marktgängiger Ertrag

Schwarzfleckigkeit index (0-50)	38
HH (%)	3
IRS (%)	5
Waschfähigkeit	5
Schorf	7
Puderschorf	8
Äußere Beschädigungen	3

1 = Sehr anfällig, 9 = Resistent

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	7
Durchwuchs	7

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

LADY ROSETTA

MEIJER POTATO

Pflanzen

Vorgekeimtes Pflanzgut, zehn Tage früher rodefähig.

Gegen Rhizoctonia / Silberschorf behandeln.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	19 cm	16 cm	70200
35/50	27 cm	23 cm	49400
50/60	39 cm	33 cm	34200
35/55	29 cm	24 cm	46000
55/60	40 cm	33 cm	33300
60 +	41 cm	34 cm	32500

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff	Durchschnittlicher Bedarf für frühe Sorte	220	kg/ha	*Basiert auf die NL*
Phosphat	Durchschnittlicher Bedarf	110	kg/ha	
Kali	Durchschnittlicher Bedarf	330	kg/ha	



Stickstoff	100%	
Phosphat	100%	
Kali	70%	30%

Kali kurz vor dem Pflanzen und während des Wachstums verwenden, um Blaufleckigkeit zu verhindern.

Wir empfehlen Extra Kali (K) für besseren Qualität.

Ernteschutz

Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.

Rechtzeitig anfangen mit Krautfäulebekämpfung.

Ernte und Lagerung

Vorsichtig roden, blauempfindlich.

Nach dem Roden sofort trocken belüften.

Sorte nicht für Langzeitlagerung geeignet.

Lagerung:

8 °C

4 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte:

Kali kurz vor dem Pflanzen und während des Wachstums verwenden, um Blaufleckigkeit zu verhindern.
Wir empfehlen Extra Kali (K) für besseren Qualität.
Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.
Vorsichtig roden, blauempfindlich.

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.