COUNTRY


MELODY x SOUND



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

S'adapte à tous types de climats.
Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.
Variété savoureuse adaptée au marché du frais.
Performances constantes au champ.
Convient à un large éventail de marchés culinaires.
Très peu sensible aux maladies de présentation.



Caractéristiques

Forme du tubercule	RO	
Tubercules/pied	14	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	7,5 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	6,4	
Couleur de la peau	Y	
Couleur de la chair	6,7	
Qualité culinaire	7,9 B	A B C D

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	112	106	102
MS (%)	19,4	20,1	20,5
PSE	353	367	377
Calibre (Ø mm)	53	57	56

Ro1	9
Ro2/3	3
Ro5	1
Pa2	5
Pa3	1
TRV	7
Virus du Moptop	5

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	9
wz 2 (G1)	6
wz 6 (O1)	6
wz 18 (T1)	5

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7
Repousse	8

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	2
Mildiou du tubercule	
Alternaria	7
Virus-Y	8
Virus-Yntn	
Virus de l'enroulement	
Dartrose	9
Gale argentée	9
Métribuzine en pré-levée	9
Métribuzine en post-levée	7

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	6,0
Points de compression	
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	8
Fritabilité/chipabilité en octobre*	6,8
Fritabilité/chipabilité en février*	6,5
Fritabilité/chipabilité en mai*	4,7

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*
Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	8
Cœurs creux (%)	0
Tâches de rouille (%)	3
Lavabilité	7
Gale commune	7
Gale poudreuse	8
Chocs de type fracture	7

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

02/11/2026

COUNTRY

MEIJER POTATO

Plantation

Attendre le "stade points blancs" avant de planter.

Planter à une profondeur normale.

Eviter les parcelles avec un historique mop-top.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	22 cm	18 cm	60600
35/50	35 cm	29 cm	38100
50/60	41 cm	34 cm	32500

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N) Azote:	Besoins moyens pour une variété demi-précoce	230	kg/ha	}	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5) Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha		
(K2O) Potasse:	Besoins moyens	350	kg/ha		



(N) Azote:	80%	20%
(P2O5) Phosphate:	100%	
(K2O) Potasse:	100%	

Protection des cultures

Sensible à la dose de 150 g/ha de Métribuzine en post-levée.

Ne pas attendre la maturité avant défanage afin d'optimiser la qualité de présentation.

Récolte et stockage

Le défanage doit être correctement réalisé afin d'assurer un bon stockage.

Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.

Pour une utilisation en frites ménagères, stocker à 7°C

Stockage:

5 °C

8 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Sensible à la dose de 150 g/ha de Métribuzine en post-levée.
Ne pas attendre la maturité avant défanage afin d'optimiser la qualité de présentation.
Pour une utilisation en frites ménagères, stocker à 7°C

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils