JAZZY (0-40 mm)

FRANCELINE x CUPIDO



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Goût, texture et tenue à la cuisson excellents.
Très belle qualité de présentation.
Variété à très forte tubérisation.
Convient parfaitement à la production de grenailles.
Peu sensible à la gâle commune.



Caractéristiques

Forme du tubercule	L	
Tubercules/pied	20	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	9,8 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	7,6	
Couleur de la peau	Y	
Couleur de la chair	6,9	
Qualité culinaire	8 A	

A B C D

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	67	68	82
MS (%)	17,6	18,9	19,4
PSE	317	343	354
Calibre (Ø mm)	37	38	39

Ro1	2
Ro2/3	1
Ro5	1
Pa2	2
Pa3	1
TRV	7
Virus du Moptop	9

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	4
wz 6 (O1)	5
wz 18 (T1)	6

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7
Repousse	7

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	3
Mildiou du tubercule	3
Alternaria	5
Virus-Y	6
Virus-Yntn	7
Virus de l'enroulement	
Dartrose	9
Gale argentée	9
Métribuzine en pré-levée	9
Métribuzine en post-levée	3

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	2,2
Points de compression	Plutôt sensible
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	4
Fritabilité/chipabilité en octobre*	4,3
Fritabilité/chipabilité en février*	3,5
Fritabilité/chipabilité en mai*	3,3

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*

Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	5
Cœurs creux (%)	0
Tâches de rouille (%)	0
Lavabilité	8
Gale commune	7
Gale poudreuse	8
Chocs de type fracture	7

1 = très sensible à 9 = résistant

ROBUST MARKETABLE YIELD

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

JAZZY (0-40 mm)

Plantation

Garder les plants dans au frais avant plantation, afin d'éviter leur germination.
Planter à une profondeur normale.
La production en billon est un atout de taille pour optimizer la production de grenaill
Prendre contact avec votre vendeur afin d'en savoir plus.
Traiter le plant contre le rhizoctone et la gale argentée.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
25/30	15 cm	13 cm	88900
30/40	20 cm	17 cm	66700
40/50	26 cm	22 cm	51300
30/50	23 cm	19 cm	58000
50/55	32 cm	27 cm	41700

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.
Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété précoce	150	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins élevés pour une variété précoce	160	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins faibles pour une variété précoce	250	kg/ha	



(N)	Azote:	100%
(P2O5)	Phosphate:	100%
(K2O)	Potasse:	100%

Afin d'augmenter la tubérisation, l'application de phosphore dans le rang est préconisé.

Protection des cultures

Sensible à la dose de 150 g/ha de Métribuzine en post-levée.
Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.
Grossissement rapide des tubercules en fin de cycle; défaner à temps.

Récolte et stockage

Récolter dès que la peau est faite, soit environs 18 jours après défannage.
Dormance courte, après récolte et cicactrisation, abaisser rapidement
la température, la maintenir stable et débuter les anti-germinatifs.
Dès que les tubercules sont secs, appliquer un antigerminatif.

Stockage:
2 °C
6 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Garder les plants dans au frais avant plantation, afin d'éviter leur germination.
La production en billon est un atout de taille pour optimizer la production de grenailles.
Afin d'augmenter la tubérisation, l'application de phosphore dans le rang est préconisé.
Récolter dès que la peau est faite, soit environs 18 jours après défannage.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

02/11/2026