JAZZY

FRANCELINE x CUPIDO



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Goût, texture et tenue à la cuisson excellents.
Très belle qualité de présentation.
Variété à très forte tubérisation.
Correspond au marché de la chair ferme et de la grenaille.
Peu sensible à la gâle commune.



Caractéristiques

Forme du tubercule	L	
Tubercules/pied	20	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	9,8	cm
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	7,6	
Couleur de la peau	Y	
Couleur de la chair	6,9	
Qualité culinaire	8 A	

A B C D

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	67	68	82
MS (%)	17,6	18,9	19,4
PSE	317	343	354
Calibre (Ø mm)	37	38	39

Ro1	2
Ro2/3	1
Ro5	1
Pa2	2
Pa3	1
TRV	7
Virus du Moptop	9

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	4
wz 6 (O1)	5
wz 18 (T1)	6

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7
Repousse	7

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	3
Mildiou du tubercule	3
Alternaria	5
Virus-Y	6
Virus-Yntn	7
Virus de l'enroulement	
Dartrose	9
Gale argentée	9
Métribuzine en pré-levée	9
Métribuzine en post-levée	3

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	2,2
Points de compression	Plutôt sensible
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	4
Fritabilité/chipabilité en octobre*	4,3
Fritabilité/chipabilité en février*	3,5
Fritabilité/chipabilité en mai*	3,3

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*

Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	5
Cœurs creux (%)	0
Tâches de rouille (%)	0
Lavabilité	8
Gale commune	7
Gale poudreuse	8
Chocs de type fracture	7

1 = très sensible à 9 = résistant

ROBUST MARKETABLE YIELD

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

02/11/2026

JAZZY

MEIJER POTATO

Plantation

Garder les plants dans au frais avant plantation, afin d'éviter leur germination.
Planter à une profondeur normale.
Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.
Traiter le plant contre le rhizoctone et la gale argentée.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
25/30	19 cm	16 cm	70200
30/40	25 cm	21 cm	53300
40/50	33 cm	28 cm	40400
30/50	29 cm	24 cm	46000
50/55	40 cm	33 cm	33300

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.
Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété précoce	175	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins élevés pour une variété précoce	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins faibles pour une variété précoce	300	kg/ha	



(N)	Azote:	100%
(P2O5)	Phosphate:	100%
(K2O)	Potasse:	100%

Afin d'augmenter la tubérisation, l'application de phosphore dans le rang est préconisé.

Protection des cultures

Sensible à la dose de 150 g/ha de Métribuzine en post-levée.
Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.
Grossissement rapide des tubercules en fin de cycle; défaner à temps.

Récolte et stockage

Récolter dès que la peau est faite, soit environs 18 jours après défannage.
Dormance courte, après récolte et cicactrisation, abaisser rapidement
la température, la maintenir stable et débuter les anti-germinatifs.
Dès que les tubercules sont secs, appliquer un antigerminatif.

Stockage:
2 °C
6 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Garder les plants dans au frais avant plantation, afin d'éviter leur germination.
Afin d'augmenter la tubérisation, l'application de phosphore dans le rang est préconisé.
Récolter dès que la peau est faite, soit environs 18 jours après défannage.
Dormance courte, après récolte et cicactrisation, abaisser rapidement
la température, la maintenir stable et débuter les anti-germinatifs.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils