LADY AMARILLA

AGRIA x HERMES



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Bonne qualité de cuisson après un stockage long terme.
Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.
Variété peu sensible aux chocs.
Dormance longue, variété adaptée aux stockages long terme.



Caractéristiques

Forme du tubercule	O	
Tubercules/pied	11	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	8,2 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	7,3	
Couleur de la peau	DY	
Couleur de la chair	7,1	
	-	

Adaptabilité vis à vis du sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	78	77	79
MS (%)	20,5	21,7	21,4
PSE	377	400	394
Calibre (Ø mm)	48	54	53

Ro1	1
Ro2/3	1
Ro5	
Pa2	1
Pa3	1
TRV	8
Virus du Moptop	9

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	4
wz 6 (O1)	5
wz 18 (T1)	4

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7
Repousse	8

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	4
Mildiou du tubercule	5
Alternaria	5
Virus-Y	8
Virus-Yntn	7
Virus de l'enroulement	
Dartrose	7
Gale argentée	7
Métribuzine en pré-levée	9
Métribuzine en post-levée	9

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	7,7
Points de compression	Plutôt tolérante
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	5
Fritabilité/chipabilité en octobre*	7,4
Fritabilité/chipabilité en février*	7,9
Fritabilité/chipabilité en mai*	7,8

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*

Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	2
Cœurs creux (%)	0
Tâches de rouille (%)	0
Lavabilité	6
Gale commune	7
Gale poudreuse	8
Chocs de type fracture	7

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

02/11/2026

LADY AMARILLA

MEIJER POTATO

Plantation

Ne pas planter trop tôt dans un sol trop froid (> 8° C).
Attendre le "stade points blancs" avant de planter.
Ne pas égermer avant plantation.
Ne pas cultiver en sols lourds.
Convient pour les sols à taux de minèralisation élevé (matière organique).

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
30/40	31 cm	26 cm	43000
40/50	35 cm	29 cm	38100
35/55	33 cm	28 cm	40400
50/60	39 cm	33 cm	34200

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.
Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété chipable de maturité moyenne	250	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins moyens	300	kg/ha	



(N)	Azote:	70%	30%
(P2O5)	Phosphate:	100%	
(K2O)	Potasse:	100%	

Le fractionnement de l'azote est nécessaire pour obtenir de bons rendements.
Eviter d'appliquer du potassium sous forme chlorure, afin de conserver la matière sèche.

Protection des cultures

Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.
En cas de forte pression puceron, proteger le feuillage de toute attaque.

Récolte et stockage

Attendre la désintégration complète des mères avant arrachage.
Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.

Stockage:
7 °C
9 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Ne pas planter trop tôt dans un sol trop froid (> 8° C).
Attendre le "stade points blancs" avant de planter.
Eviter d'appliquer du potassium sous forme chlorure, afin de conserver la matière sèche.
Le fractionnement de l'azote est nécessaire pour obtenir de bons rendements.
Attendre la désintégration complète des mères avant arrachage.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

02/11/2026