LADY ANNA

CMK1993-042-005 x FONTANE



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Excellente couleur de frite pendant tout le stockage.
Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.
Résistante à tous les types de nématodes à kyste
Dormance longue, variété adaptée aux stockages long terme.
Répartition homogène de la matière sèche dans le tubercule.
Très bon ratio brut/net pour le producteur et l'usine.



Caractéristiques

Forme du tubercule	L	
Tubercules/pied	11	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	9,8	cm
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	6,5	
Couleur de la peau	Y	
Couleur de la chair	6,8	
Qualité culinaire	8 B	

A B C D

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	85	89	83
MS (%)	21,6	22,6	23,0
PSE	398	419	426
Calibre (Ø mm)	46	52	51

Ro1	9
Ro2/3	8
Ro5	4
Pa2	8
Pa3	2
TRV	7
Virus du Moptop	9

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	4
wz 6 (O1)	5
wz 18 (T1)	4

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	5
Repousse	7

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	4
Mildiou du tubercule	3
Alternaria	5
Virus-Y	7
Virus-Yntn	7
Virus de l'enroulement	
Dartrose	9
Gale argentée	9
Métribuzine en pré-levée	9
Métribuzine en post-levée	9

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	6,1
Points de compression	Plutôt tolérante
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	7
Fritabilité/chipabilité en octobre*	7,2
Fritabilité/chipabilité en février*	6,6
Fritabilité/chipabilité en mai*	6,3

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*

Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

ROBUST STORABILITY

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	6
Cœurs creux (%)	0
Tâches de rouille (%)	1
Lavabilité	7
Gale commune	7
Gale poudreuse	8
Chocs de type fracture	5

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

LADY ANNA

MEIJER POTATO

Plantation

Ne pas planter trop tôt dans un sol trop froid (> 8° C).
Attendre le "stade points blancs" avant de planter.
Ne pas endommager les germes mécaniquement ou chimiquement.
Risque de tâches de rouilles en sols forts sableux.
Planter à faible profondeur.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	33 cm	28 cm	40400
35/45	40 cm	33 cm	33300
45/50	42 cm	35 cm	31700
50/60	44 cm	37 cm	30300
50/60 CUT	39 cm	33 cm	34200

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.
Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins élevés pour une variété demi-tardive	275	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins moyens	300	kg/ha	



(N)	Azote:	70% 30%
(P2O5)	Phosphate:	100%
(K2O)	Potasse:	100%

Le fractionnement de l'azote est nécessaire pour obtenir de bons rendements.

Protection des cultures

Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.
Sensible à l'alternaria, démarrer la protection anti-alternaria à temps.

Récolte et stockage

Attendre la désintégration complète des mères avant arrachage.
Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.
Le stockage à l'Ethylene peut influencer négativement la fritabilité.

Stockage:
6 °C
8 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Ne pas planter trop tôt dans un sol trop froid (> 8° C).
Attendre le "stade points blancs" avant de planter.
Ne pas endommager les germes mécaniquement ou chimiquement.
Attendre la désintégration complète des mères avant arrachage.
Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils