LADY CHRISTL

WS73-3-391 x MANSOUR



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Goût, texture et tenue à la cuisson excellents.
Très précoce.
Variété à très forte tubérisation.
Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.
Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.



Caractéristiques

Forme du tubercule	O	
Tubercules/pied	14	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	7,8	cm
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	8,0	
Couleur de la peau	Y	
Couleur de la chair	6,8	
Qualité culinaire	8 A	

A B C D

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	85	73	96
MS (%)	17,9	19,2	19,5
PSE	324	349	355
Calibre (Ø mm)	45	48	50

Ro1	9	●
Ro2/3	6	◐
Ro5		○
Pa2		○
Pa3		○
TRV		○
Virus du Moptop	9	●

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	10	●
wz 2 (G1)		○
wz 6 (O1)	7	●
wz 18 (T1)		○

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec		○
Repousse	8	●

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	3
Mildiou du tubercule	3
Alternaria	9
Virus-Y	8
Virus-Yntn	9
Virus de l'enroulement	7
Dartrose	7
Gale argentée	7
Métribuzine en pré-levée	5
Métribuzine en post-levée	5

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	3,3
Points de compression	
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	6
Fritabilité/chipabilité en octobre*	4,7
Fritabilité/chipabilité en février*	3,2
Fritabilité/chipabilité en mai*	3,0

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*

Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	10
Cœurs creux (%)	0
Tâches de rouille (%)	8
Lavabilité	8
Gale commune	8
Gale poudreuse	3
Chocs de type fracture	7

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

LADY CHRISTL

MEIJER POTATO

Plantation

Prégermination avant plantation possible, dans des conditions appropriées.

Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/30	18 cm	15 cm	74100
30/40	24 cm	20 cm	55600
40/50	30 cm	25 cm	44400
50/55	34 cm	28 cm	39200

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété précoce	150	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins moyens	230	kg/ha	



(N)	Azote:	100%
(P2O5)	Phosphate:	100%
(K2O)	Potasse:	100%

Attention aux carences en magnesie.

Protection des cultures

Légèrement sensible au Metribuzin.

Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.

Récolte et stockage

Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.

Variété non adaptée au stockage long-terme.

Stockage:

4 °C

2 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.
Attention aux carences en magnesie.
Légèrement sensible au Metribuzin.
Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils