LADY CLAIRE

AGRIA x KW78-34-470



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Bonne qualité de cuisson après un stockage long terme.
Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.
Variété peu sensible aux chocs.
Qualite de transformation élevée et homogène.



Caractéristiques

Forme du tubercule	RO	
Tubercules/pied	11	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	7,2 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	7,6	
Couleur de la peau	DY	
Couleur de la chair	7,0	
	-	

Adaptabilité vis à vis du sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	62	69	69
MS (%)	21,1	23,3	23,0
PSE	389	433	426
Calibre (Ø mm)	47	54	51

Ro1	9
Ro2/3	6
Ro5	
Pa2	
Pa3	
TRV	7
Virus du Moptop	9

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	
wz 6 (O1)	8
wz 18 (T1)	

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7
Repousse	7

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	3
Mildiou du tubercule	3
Alternaria	7
Virus-Y	6
Virus-Yntn	7
Virus de l'enroulement	
Dartrose	9
Gale argentée	9
Métribuzine en pré-levée	7
Métribuzine en post-levée	9

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	6,1
Points de compression	Sensible
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	7
Fritabilité/chipabilité en octobre*	7,6
Fritabilité/chipabilité en février*	7,7
Fritabilité/chipabilité en mai*	7,3

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*

Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	12
Cœurs creux (%)	1
Tâches de rouille (%)	1
Lavabilité	6
Gale commune	7
Gale poudreuse	8
Chocs de type fracture	9

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

LADY CLAIRE

MEIJER POTATO

Plantation

Garder les plants dans au frais avant plantation, afin d'éviter leur germination.
Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.
Planter à une profondeur normale.
Convient pour les sols à taux de minèralisation élevé (matière organique).
Uniquement dans les champs qui peuvent être irrigués.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	21 cm	18 cm	63500
35/55	33 cm	28 cm	40400
30/40	30 cm	25 cm	44400
40/50	35 cm	29 cm	38100
50/60	38 cm	32 cm	35100

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.
Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins élevés pour une variété chipable précoce	250	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins élevés pour une variété chipable précoce	350	kg/ha	



(N)	Azote:	70%	30%
(P2O5)	Phosphate:	100%	
(K2O)	Potasse:	70%	30%

Le fractionnement de l'azote est nécessaire pour obtenir de bons rendements.
Les apports en potasse sont préconisés au printemps ET en culture afin de minimiser le risque de chocs internes.

Protection des cultures

Sensible à la dose de 450 g/ha de Métribuzine en pre-levée.
Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.
Sensible à l'alternaria, démarrer la protection anti-alternaria à temps.
L'apport de magnésium en culture aide à maintenir le feuillage.

Récolte et stockage

Dormance courte, après récolte et cicactrisation, abaisser rapidement
la température, la maintenir stable et débuter les anti-germinatifs.
Dès que les tubercules sont secs, appliquer un antigerminatif.

Stockage:
6 °C
9 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Uniquement dans les champs qui peuvent être irrigués.
Le fractionnement de l'azote est nécessaire pour obtenir de bons rendements.
Les apports en potasse sont préconisés au printemps ET en culture afin de minimiser le risque de chocs internes.
Sensible à l'alternaria, démarrer la protection anti-alternaria à temps.
Dès que les tubercules sont secs, appliquer un antigerminatif.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

02/11/2026