LADY JANE

AGRIA x CMK2005-709-005



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Plante robuste et tolérante aux stress climatiques.
Variété à matière sèche élevée.
Bonne qualité de cuisson après un stockage long terme.



Caractéristiques

Forme du tubercule	LO	
Tubercules/pied	12	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	8,9 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	6,1	
Couleur de la peau	DY	
Couleur de la chair	7,5	
	-	

Adaptabilité vis à vis du sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	120	117	108
MS (%)	21,9	22,6	22,9
PSE	404	419	425
Calibre (Ø mm)	53	60	55

Ro1	9
Ro2/3	3
Ro5	6
Pa2	3
Pa3	1
TRV	6
Virus du Moptop	3

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	
wz 6 (O1)	4
wz 18 (T1)	4

3 = très sensible à 10 = résistant

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	7
Repousse	7

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	9
Mildiou du tubercule	7
Alternaria	7
Virus-Y	8
Virus-Yntn	7
Virus de l'enroulement	4
Dartrose	7
Gale argentée	7
Métribuzine en pré-levée	5
Métribuzine en post-levée	5

1 = très sensible à 9 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	5,4
Points de compression	Plutôt tolérante
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	9
Fritabilité/chipabilité en octobre*	6,0
Fritabilité/chipabilité en février*	5,9
Fritabilité/chipabilité en mai*	4,0

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*

Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	22
Cœurs creux (%)	3
Tâches de rouille (%)	2
Lavabilité	6
Gale commune	7
Gale poudreuse	8
Chocs de type fracture	5

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

02/11/2026

LADY JANE

MEIJER POTATO

Plantation

Risque de tâches de rouilles en sols forts sableux.

Attendre le "stade points blancs" avant de planter.

Planter profond et faire de larges buttes afin d'éviter le verdissement.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	25 cm	21 cm	53300
35/50	34 cm	28 cm	39200
50/60	40 cm	33 cm	33300
50/60 CUT	31 cm	26 cm	43000

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété demi-tardive	250	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins élevés	350	kg/ha	



(N)	Azote:	80%	20%
(P2O5)	Phosphate:	100%	
(K2O)	Potasse:	70%	30%

Les apports en potasse sont préconisés au printemps ET en culture afin de minimiser le risque de chocs internes.

Le fractionnement d'azote est nécessaire pour le maintenir efficient jusqu'à la fin du grossissement des tubercules.

Protection des cultures

Sensible à la dose de 450 g/ha de Métribuzine en pre-levée.

Lutte contre le mildiou comme d'habitude : pulvérisez lorsqu'il y a un risque, à dose complète et à fréquence recommandée.

Les tubercules grossissent lorsque le feuillage est en sénescence; laissez la sénescence se produire pour un rendement optimal.

Récolte et stockage

Récolter avec précaution, sensible aux chocs.

Après l'arrachage, bien sécher les pommes de terre rapidement, par ventilation.

Dormance courte, après récolte et cicactrisation, abaisser rapidement

la température, la maintenir stable et débuter les anti-germinatifs.

Stockage:

7 °C

8 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Planter profond et faire de larges buttes afin d'éviter le verdissement.
Le fractionnement d'azote est nécessaire pour le maintenir efficient jusqu'à la fin du grossissement des tubercules.
Les apports en potasse sont préconisés au printemps ET en culture afin de minimiser le risque de chocs internes.
Les tubercules grossissent lorsque le feuillage est en sénescence; laissez la sénescence se produire pour un rendement optimal.
Récolter avec précaution, sensible aux chocs.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

02/11/2026