JAZZY (0-40 mm)

Bettsystem

FRANCELINE x CUPIDO



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Exzellente Geschmack, Textur und Kochqualität.
Sehr schöne Schalequalität.
Sorte mit sehr hohem tuberization.
Sorte geeignet für Anbau von Babykartoffeln.
Geringe Anfälligkeit für Schorf.

Eigenschaften:

Knollenform	LO	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	9,4 cm	
Reifezeit (4=früh, 9=spät)	7,8	
Schalenfarbe	LY	
Fleischfarbe	6,7	
Speisequalität	8 A	A B C D

Chemikalienanforderung

Krautfäule	3
Knolle Krautfäule	Anfällig
Alternaria Knollenfäule	ziemlich anfällig
Y-Virus	6
Yntn-virus	7
Blattrollenvirus	Tolerant
Schwarzer Punkt	Tolerant
Silberschorf	Tolerant
Metribuzin Vorauflauf	Tolerant
Metribuzin nach dem Auflaufen	Anfällig

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	57	62	68
DM (%)	17,1	19,0	19,2
UWG	307	346	350
Knollen Ø (mm)	35	37	39

Ro1	3
Ro2/3	
Ro5	
Pa2	
Pa3	
wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	4
wz 6 (O1)	4
wz 18 (T1)	6
TRV	7
Moptop-Virus	Tolerant

Lagerfähigkeit

Keimruhe (2 = kurz; 8 = lang)	2,0
Druckpunkte	ziemlich anfällig
Fusarium	4
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	n/a n/a
Verarbeitungsfarbe im Februar*	n/a n/a
verarbeitungsfarbe im Mai*	n/a n/a

**Kartoffeln bei 8°C gelagert*

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	Anfällig
Durchwuchs	7

Marktgängiger Ertrag

Blau/Schwarzfleckigkeit index (0-50)	3
Waschfähigkeit	8
Schorf	7
Puderschorf	6
IRS	0,1
HH	0,0
Äußere Beschädigungen	Ziemlich tolerant

Düngemittelbedarf

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Dosis	Standard	Hoch (+25%)	Niedrig (-25%)	Hoch (+25%)	Standard	Standard	Standard
Dosierungen #	1	1	1	4	1	1	1

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

JAZZY (0-40 mm)


Pflanzen

Pflanzgut vor Pflanzen ruhig halten und pflanzen Sie gleich aus Lager.
Pflanztiefe im Bettsystem ca. 12 cm.
Ein engerer Pflanzabstand ergibt mehr Knollen pro ha.
Ausreichende Feuchtigkeit bei Knollenbildung gibt mehr Knollen/Hektar.

Sortierung	150 cm	180 cm	Plant/ha
25/30	18 cm	15 cm	111000
30/40	22 cm	18 cm	91000
40/50	26 cm	22 cm	77000
50/55	31 cm	26 cm	65000

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.



				Gesamt
Stickstoff	(N)	125	25	**150**
Phosphat	(P_2O_5)	160		**160**
Kali	(K_2O)	250		**250**

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, S)

Um den Knollenansatz zu erhöhen, wird empfohlen, Phosphat im Dämmen aufzutragen.

Ernteschutz

Anfällig für die Verwendung von 150 g / ha Metribuzin nach dem Auflaufen.
Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.
Schnelles Knollenwachstum am Ende des Zyklus, rechtzeitig abtöten.

Ernte und Lagerung

Wann Schalenfest gleich roden anfangen, ca. 18 Tage bei dieser Sorte.
Kurze Keimruhe; Nach der Ernte und Wundheilung schnell kühlen und halten Sie die Temperatur stabil.
Sobald die Kartoffeln trocken sind Keimungsinhibitoren anwenden.

Lagerung:
3 °C
6 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte:

Pflanzgut vor Pflanzen ruhig halten und pflanzen Sie gleich aus Lager.
Ein engerer Pflanzabstand ergibt mehr Knollen pro ha.
Um den Knollenansatz zu erhöhen, wird empfohlen, Phosphat im Dämmen aufzutragen.
Wann Schalenfest gleich roden anfangen, ca. 18 Tage bei dieser Sorte.

Halten Sie lagerung Temperatur stabil

Meijer Potato ist nicht verantwortlich für mögliche negative Auswirkungen aus diesem Empfehlung.

6-4-2022